

5.แจ้งแนวทางการให้วัคซีน IPV กรณีวัคซีนขาดแคลนชั่วคราว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางที่ 1 : คำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) กรณีวัคซีนขาดคราว

คำแนะนำ	ครั้งที่ 1 (2 เดือน)	ครั้งที่ 2 (4 เดือน)	ครั้งที่ 3 (6 เดือน)	ครั้งที่ 4 (1 ปี 6 เดือน)	ครั้งที่ 5 (4 ปี)
กรณีวัคซีน IPV ตามคำแนะนำปกติ	IPV1	IPV2	OPV1	OPV2	OPV3
กรณีวัคซีน IPV ขาดคราว					
1) กรณีหน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอในการให้วัคซีน 1 ครั้งต่อคน* (สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน)	IPV1	IPV2 (+/-)	OPV1 IPV2 (+/-)	OPV2	OPV3
2) กรณีหน่วยบริการมีวัคซีน IPV เพียงพอในการให้วัคซีน 1 ครั้งต่อคน (สำหรับเด็กอายุ 4 เดือน ที่ได้รับวัคซีน IPV มาแล้ว 1 ครั้ง)	IPV1	เลื่อน IPV 2	OPV1 IPV2**	OPV2	OPV3
3) กรณีหน่วยบริการไม่มีวัคซีน IPV	เลื่อน IPV1 ไปก่อน และให้ ฉีดโดยเร็วที่สุด เมื่อมีวัคซีน	IPV2	OPV1	OPV2	OPV3

หมายเหตุ : * กรณีพบเด็กอายุ 4 เดือน ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน IPV มาก่อน ขอให้วัคซีน IPV 1 ทันที

** สามารถให้วัคซีน IPV2 ได้ทันที ก่อนอายุ 6 เดือน เมื่อมีวัคซีน IPV เพียงพอ

*** กรณีเด็กที่ได้รับวัคซีน OPV เมื่ออายุ 2 เดือน ขอให้วัคซีนโปลิโอตามคำแนะนำเดิม (สูตร 1 IPV + 5 OPV)

ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย

อายุ	ชนิดวัคซีน
หญิงตั้งครรภ์	dT 3 ครั้ง (ตามประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต) Flu 1 ครั้ง (ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป) สป (กระจายให้หน่วยบริการภายใน มด-กพ 67)
แรกเกิด	BCG, HB1
1 เดือน	HB2 (เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี)
2 เดือน	OPV1, DTP-HB1 (DTP-HB-Hib1), RV1
4 เดือน	OPV2, DTP-HB2 (DTP-HB-Hib2), IPV, RV2
6 เดือน	OPV3, DTP-HB3 (DTP-HB-Hib3),
9 เดือน	MMR1
12 เดือน	LAJE1
18 เดือน	MMR2, OPV4, DTP4 (*ปรับเป็นอายุแรกอายุ 2 ปี 6 เดือน เป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน เริ่มดำเนินการ มด.64)
2 1/2 ปี	LAJE2
4 ปี	OPV5, DTP5
7 ปี (นร.ป.1)	MR /MMR, HB, LAJE, IPV, dT, OPV, BCG (เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์)
11 ปี (นร.ป.5)	HPV1, HPV2 (ให้ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน)
12 ปี (นร.ป.6)	dT
อายุ 20 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หรืออายุ 20, 30, 40, 50, 60, 70 ปี	dT (1 ครั้ง ทุก 10 ปี)
กลุ่มเสี่ยง(ภู.ตั้งครรภ์อายุครรภ์>4 ต., เด็กอายุ 6ต.-2ปี, หน.โรคเรื้อรัง 7 โรค*, ผู้สูงอายุ >65 ปี, ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อาการ), ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	Influenza (ประจำปีฤดูกาล, ประจำปี) (* : ปอดอักเสบเฉียบพลัน, หัด, หัดเยอรมัน, หัดเยอรมัน, ไขหวัดใหญ่, ไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัดใหญ่)

