

มาตรการการป้องกันและควบคุมโรค

มาตรการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยุงลาย

มาตรการควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วย โรคติดต่อนำโดยุงลาย

เมื่อได้รับแจ้ง
ควรดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทันที ตามมาตรการ 3-3-1 และเฝ้าระวังโรคต่อเนื่อง 28 วัน ดังนี้

- 3 สถานพยาบาลแจ้ง รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ทราบว่าพบผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยุงลาย ภายใน 3 ชั่วโมง หลังผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย
- 3 รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุข ดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมยุงพาหะ โดยการฉีดพ่นสารเคมี (เช่น สเปรย์กระเบื้อง) และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วย ภายใน 3 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย
- 1 หน่วยงานท้องถิ่น พ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ภายใน 1 วัน หลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566 ที่มา : กองโรคติดต่อป่าตมมอช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 1622