

1.สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

1.1 สถานการณ์ไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีสัปดาห์ที่ 34/2566

◆ ประเทศ : สะสม 79,475 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 5,496 ราย เสียชีวิต 73 ราย อัตราป่วย 120.09 ต่อแสนปชก. อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.09

◆ เขตสุขภาพที่ 10: สะสม 6,483 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 468 ราย อัตราป่วย 141.33 ต่อแสนปชก. มีรายงานเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.02

-รายจังหวัด(ป่วย/ตาย) : อบ (3,520/0) ศก (1,621/1) ยส (577/0) มห (603/0) อจ (162/0)

-กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อแสนปชก.มากที่สุด : 10 - 14 ปี (735.53) 5 - 9 ปี (566.55) 0 - 4 ปี (273.15)

-อาชีพที่พบมากที่สุด : นักเรียน (59.46) รองลงมาไม่ทราบ/ในปกครอง (22.98)

-ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายระดับเขต ใน สัปดาห์ที่ 33 : HI = 9.86, CI = 2.46

* ความเสี่ยงระดับประเทศ

- แนวโน้มผู้ป่วยยังคงสูงขึ้นในหลายเขตสุขภาพ โดยมีอำเภอที่เข้าเกณฑ์ประกาศพื้นที่โรคระบาดเพิ่มขึ้นจาก 72 อำเภอเป็น 136 อำเภอ

- ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตพบ 3-5 ราย/สัปดาห์ และพบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ปัจจัยเสี่ยงที่พบ ได้แก่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่อ้วนและมีโรคประจำตัว ไปรักษาครั้งแรกช้า และได้รับยาประเภท NSAIDs

* ในพื้นที่เขต 10

- ความเสี่ยงระดับอำเภอ ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 30 - 33) :

เสี่ยงสูง 62 อำเภอ (88.57%) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 25 อำเภอ (100%),ศรีสะเกษ 19 อำเภอ (86.36%) ,

ยโสธร 7 อำเภอ (77.78%), มุกดาหาร 4 อำเภอ (57.14%) , อำนาจเจริญ 7 อำเภอ (100.00%)

** ข้อสังเกต/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา :

พบค่า CI HI สูงในพื้นที่ระบาด และผู้ป่วยมีแนวโน้มไม่ลดลง และพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน ดังนั้น

1.ควรเน้นการดำเนินมาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สื่อสารความเสี่ยง ควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 อย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาด และจำนวนผู้เสียชีวิต

2. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง

3. พื้นที่ระบาดที่ไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้ ให้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน สร้างการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนมาร่วมจัดการแก้ไขปัญหา

4. สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุมโรคในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้มปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในและนอกอาคารเรียน

อำเภอที่เข้าเกณฑ์ประกาศโรคระบาด (ตามมาตรา 9 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558)

เขตสุขภาพที่ 10


17 อำเภอ

จังหวัด	อำเภอ	ร้อยละผู้ป่วยโรคในอำเภอที่เข้าเกณฑ์	ร้อยละอำเภอเข้าเกณฑ์
อุบลราชธานี	บุณฑริก	62.50 (5/8 ตำบล)	44.00 (11/25 อำเภอ)
	เมืองอุบลราชธานี	66.67 (8/12 ตำบล)	
	สำโรง	88.89 (8/9 ตำบล)	
	สิรินธร	83.33 (5/6 ตำบล)	
	นาตาล	50.00 (2/4 ตำบล)	
	โพธิ์ไทร	66.67 (4/6 ตำบล)	
	ดอนมดแดง	75.00 (3/4 ตำบล)	
	นาเยีย	66.67 (2/3 ตำบล)	
	วารินชำราบ	43.75 (7/16 ตำบล)	
	พิบูลมังสาหาร	50.00 (7/14 ตำบล)	
ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	55.00 (10/20 ตำบล)	13.64 (3/22 อำเภอ)
	โนนคูณ	80.00 (4/5 ตำบล)	
	ขุขันธ์	58.33 (7/12 ตำบล)	
อำนาจเจริญ	ขานุมาน	60.00 (3/5 ตำบล)	14.29 (1/7 อำเภอ)
มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	69.23 (7/13 ตำบล)	28.57 (2/7 อำเภอ)
	นิคมคำสร้อย	42.86 (3/7 ตำบล)	

ตำบลระบาดตามเกณฑ์ประกาศโรคระบาด (มาตรา 9 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558) จำนวน 134 ตำบล

ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิต เพศหญิง อายุ 12 ปี โรคประจำตัว : ธาลัสซีเมีย / G6PD (รักษาในโรงพยาบาล 3 วัน) ที่อยู่ขณะป่วย ต.ดอังกาเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ



ที่มา : ทีม JIT จังหวัดศรีสะเกษ และทีม CDCU ระดับอำเภอ



ผู้ป่วยใช้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกรายอำเภอ ปี 2566

ก.บ.บ.	อำเภอ	จำนวนประชากร	รวมผู้ป่วยสะสม ปี 2566	อัตราป่วย (ต่อแสนคน)	4 สัปดาห์ล่าสุด (ป่วยคน)				รวม 4 สัปดาห์ล่าสุด
					30	31	32	33	
1	บุณฑริก	95,316	402	421.76	10	7	8	3	28
2	สิรินธร	55,347	208	375.81	13	43	6	0	62
3	สำโรง	54,159	199	367.44	16	19	18	4	57
4	นาจะหลวย	58,727	183	311.61	12	20	9	1	42
5	พิบูลมังสาหาร	129,605	338	260.79	20	21	6	11	58
6	น้ำขุ่น	33,273	86	258.47	6	2	13	9	30
7	โพธิ์ไทร	47,430	121	255.11	9	15	13	11	48
8	เขื่องใน	107,415	223	207.61	6	29	16	14	65
9	สว่างวีระวงศ์	31,173	64	205.31	4	2	6	1	13
10	นาเยีย	27,406	55	200.69	6	4	16	6	32
11	โขงเจียม	38,423	71	184.79	12	9	14	5	40
12	คอนมุดแดง	27,247	48	176.17	6	5	4	2	17
13	น้ำยืน	70,255	103	146.61	12	14	10	0	36

สถานการณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

อัตราป่วยมากกว่า 50.0 /แสน
อัตราป่วย 25.0 - 49.9 /แสน

อัตราป่วย 0.1 - 24.9 /แสน
ไม่มีผู้ป่วย

ข้อมูลสัปดาห์ปัจจุบัน มีความแปรปรวนสูง
จึงไม่น่ามาประเมินผล

9

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำวันที 4 กันยายน 2566



สรุปการรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน กันยายน 2566

สถานบริการ	ค่าHI (ร้อยละ)	ค่า CI สถานศึกษา (ร้อยละ)	ค่าCI ศาสนสถาน (ร้อยละ)
รพ.สต.คำก้อม	2.29	0	6.71
รพ.สต.คันไร่	5.96	2.84	4.85
รพ.สต.คันเปื่อย	4.24	0	0
รพ.สต.นิคม 2	9.36	18.18	19.44
รพ.สต.หัวสะพาน	6.83	4.46	5.66
รพ.สต.ช่องเม็ก	23.44	0.38	1.90
รพ.สต.แก่งศรีโคตร	4.6	3.3	1.68
PCU นิคม	6.87	2.94	2.54
รวม	7.05	2.53	3.85

อำเภอสิรินธร หมู่บ้านที่พบการระบาดของ 2 Generation ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ปิดการระบาด 4 หมู่บ้าน คงเหลือ 10 แยกรายตำบลได้แก่

โนนก่อ ม.3,6

ช่องเม็ก ม.1,3,5,13

นิคม ม.4,6,7,8